



Amiloidose associada à transtirretina

AG10-501

Acoramidis para prevenção de amiloidose associada à transtirretina

Regional: Bahia

Investigador Principal: Dr. Tonnison de Oliveira Silva

Informações: Núcleo de Captação - (11) 94257-9076


Clinical Trial: NCT06563895

<https://clinicaltrials.gov/study/NCT06563895?term=AG10-501&rank=1>

Perfil de paciente

CrITÉRIOS de Inclusão:

- ≥ 18 a ≤ 76 anos de idade;
 - Variante do gene TTR conhecidamente patogênica (por exemplo, V30M/p.V50M, V122I/p.V142I, T60A/p.T80A ou todas as demais variantes de TTR patogênica) confirmada pelo laboratório central antes da randomização;
 - Os participantes devem ser assintomáticos de uma variante de TTR patogênica conhecidas;
 - A idade do participante não deve ser mais do que 10 anos (≤ 10) menor que a do PAD0.
- > **Exemplo:** se a PAD0 de um participante for determinada como sendo de 50 anos, a idade do participante deverá ser no mínimo 40 anos de idade (≥ 40) e menor ou igual a 75 anos de idade (≤ 75).



Estratégias de tratamento em pacientes com insuficiência cardíaca, casos de intolerância ou contraindicação às terapias convencionais.

Estudo Finality-HF

Crítérios de inclusão

- Idade maior ou igual a 18 anos
- IC FC < 40% classe funcional II, II ou IV NYHA
- Sem uso de MRA por INTOLERÂNCIA (Hipercalemia, hipotensão, piora da função renal, efeitos adversos sexuais como: ginecomastia) ou INELEGIBILIDADE (critérios do investigador)

Crítérios de exclusão

- Uso de MRA nos últimos 30 dias
- História prévia de K maior ou igual a 6 por uso de MRA.

Responsável: Dr. Tonisson de Oliveira Silva
CRM-BA: 16403 RQE: 8552

Centro de Pesquisa Clínica da Escola
Bahiana de Medicina e Saúde Pública
cpc@bahiana.edu.br
Tel.: (71) 99968-1872 / (71) 3276-8232.



**SAÚDE
BAHIANA**